




Schemat postępowania w screeningu Raka Szyjki Macicy (RSM) – wersja XII 2021

* SCREENING ≤ 30 r.ż.

CYTOLOGIA: Klasyczna lub LBC (preferowana)
(co 1-3 lata – zależnie od uprzedniego wyniku)

NILM/A1/B1
KONTROLA ZA 1-3 lata



Dopuszcza się:


- triage z wykorzystaniem algorytmów AI do automatycznej oceny nabłonka po VIA – metoda pomocnicza w ustaleniu postępowania. Decyzja o postępowaniu pozostaje ustalona według schematu opartego na wyniku Co-Test.
- postępowanie alternatywne

UWAGA: KOLPOSKOPIA oznacza ocenę kolposkopową z wycinkami celowanymi i biopsją kanału szyjki macicy.



Schemat postępowania w screeningu Raka Szyjki Macicy (RSM) – wersja XII 2021

* SCREENING > 30 r.ż. (do 70 r.ż.)



* Dopuszcza się:

- triage z wykorzystaniem algorytmów AI do automatycznej oceny nabłonka po VIA – metoda pomocnicza w ustaleniu postępowania. Decyzja o postępowaniu pozostaje ustalona według schematu opartego na wyniku Co-Test.
- postępowanie alternatywne

UWAGA: KOLPOSKOPIA oznacza ocenę kolposkopową z wycinkami celowanymi i biopsją kanału szyjki macicy.